


Movikol junior til behandling af forstoppelse



Doctor Marla.dk
Børn & unge klinik

Hvad er Movicol Junior?

Movicol Junior er et afføringsmiddel. Det virker ved at binde vand i tarmens indhold og dermed sørge for at afføringen i tarmen bliver blød. Når afføringen er blød, er den lettere at få ud. Den afførende virkning indtræder sædvanligvis efter 12-24 timer.



Hvordan foregår behandling med movikol?

Når dit barn påbegynder Movicol Junior- behandlingen, starter man



med en udtømning - det betyder, at dit barns tarm tømmes for hård afføring.

For at udtømme tarmen gives der meget Movicol Junior de første dage. Dit barns afføring skal se ud som type 7 på Bristol-skalaen for at være helt udtømt.








Når dit barns tarm er helt tom for afføring, over- går man til vedligeholdelsesbehandlingen. Her skal dit barn fortsætte med

pulveret, men I skal nu til at finde den rette daglige dosis.

Til at begynde med kan det være lidt svært at finde frem til den rigtige dosis, men I må prøve jer frem. Det vigtigste er, at dit barn har mindst en blød afføring dagligt uden smerter eller andet ubehag. Afføringen skal se ud som type 4-5 på Bristol-skalaen.

Denne del af behandlingen varer minimum 3 måneder og ofte længere.

Bristol-skalaen:

Type 1		Separate hårde klumper, der ligner nødder.
Type 2		Pølseform, men med klumper.
Type 3		Ligner en pølse, men med revner på ydersiden.
Type 4		Ligner en pølse eller orm, smidig og blød.
Type 5		Bløde klumper med skarpe kanter (let at få ud)
Type 6		Iturevne småstykker.
Type 7		Vandig uden klumper. Kun væske.

Hvordan blandes Movicol?

Movicol er et hvidt pulver, som skal blandes op i kold eller varm væske - væsken må dog ikke være tykkere end mælk.

For at få den rigtige virkning er det meget vigtigt, at pulveret blandes i den mængde væske, der står angivet på pakningen. Herefter drikkes væsken.

Det vil sige at:


- En doseringspose Movicol Junior blandes i 62,5 ml væske.

Man kan godt blande yderligere væske i, hvis man er sikker på, at barnet kan drikke hele mængden.

Movicol til voksne kan købes billigere på apoteket. Ved køb af dette præparat skal I være opmærksomme på ændret doseringsforhold, og I skal rådføre jer med lægen her i klinikken.

Har du spørgsmål er du/I altid velkommen til at kontakte klinikken på

Tlf: 66 13 32 11
Man-tors ml 9.00-12.00



Doctor Marla.dk
Børn & unge klinik

MARLA CHELLAKOOTY
Børnelæge, P.h.d

📍 Skt. Anne Plads 2-4, 5 sal
5000 Odense C

☎ 66133211

📠 66133202

✉ info@doctormarla.dk

🌐 www.doctormarla.dk