


Priktest



Doctor Marla.dk
Børn & unge klinik

Hvad er en priktest?

En priktest er en undersøgelse der anvendes til at undersøge om Jeres barnet lider af allergi. Det kan f.eks. være allergi overfor diverse fødevarer; mælk, æg, hvede, kød, fisk osv., eller allergi overfor; græs-, birke- og bynkepollen, hest, hund og kat, husstøvmider, skimmel m.m. Allergi/overfølsomhed er en udbredt folkesygdom. Omkring 20 % af befolkningen lider af en eller anden form for allergi/overfølsomhed. De mest almindelige symptomer på allergi stammer fra øjne, næse, og luftveje f.eks. kløende, røde øjne, løbenæse/nyse ture og åndedrætsbesvær. Man kan også have symptomer fra hud og mave/tarm systemet i form af eksem, diarré eller hård mave.

Hvordan forberedes barnet til undersøgelsen

Man må gerne undgå at smøre med fugtighedscreme og hvis barnet har

eksem steroidcreme 14 dage før undersøgelsen.

Hvis barnet tager antihistamin stoppes behandlingen i 3 dage op til undersøgelsen.

Undgå ligeledes cremer på barnets arme (særligt på indersiderne) på selve testdagen.

Hvordan foregår priktesten

Priktesten foregår i Børnelægeklinikken. Barnet bliver testet med opløsninger af små mængder allergen, hvor man præcis ved, hvor meget og hvad der er i flasken. Antallet afhænger af barnets alder og hvilke symptomer det har.

Ved undersøgelsen bliver der sat et stykke tape med numre på underarmen, og ud for hvert tal sættes en dråbe af opløsningen. Der sættes også en dråbe med det rene opløsningsmiddel og en dråbe med histamin, som alle mennesker reagerer på (hvis de ikke har spist antihistamin eller anden medicin, der ødelægger testen), dem bruger man til at sammenligne med.

Med en lille dims, der har en spids på 1 mm, prikkes gennem dråben ned i hudens øverste lag. Det bløder sjældent og gør ikke særlig ondt. Allergenerne i dråben trænger ned og møder hudens celler, f.eks. mastceller. Har man allergi-antistof f.eks. mod kat i kroppen, sidder det også på disse celler. Er der allergen fra kat i dråben, vil allergi-antistofferne 'fange' allergenet. Når mastcellerne mærker det, vil de frigive histamin, og så kommer der en lille, kløende hævelse inden for 10-15 minutter, der ligner reaktionen efter kontakt med en brændenælde.

Selve undersøgelsen foregår ved:

- Der placeres et stykke tape med numre på indersiden af barnets arm.
- Der sættes dråber med test-ekstrakt på huden ud for numrene.
- I hver dråbe foretages et lille prik på huden.
- Dråberne tørres af og resultatet aflæses efter 10-15 min.

Hvordan aflæses resultatet?

For hver dråbe allergenekstrakt der er sat, ser man om huden har reageret med en hævelse.

Hvis barnet reagerer med tydelig hævelse på ét eller flere af ekstrakterne er det udtryk for barnet kan have allergi.

En positiv reaktion på et allergen er ikke det samme som allergi. Nogle gange kan der komme en reaktion i huden, selv om man ikke mærker symptomer på allergenet. Det kan være fordi, man skal

udsættes for meget store mængder af allergenet, f.eks. meget høje pollental, før man får problemer. Det kan også betyde, at man har en forøget risiko for senere at få allergi for allergenet.

Ved tvivl om resultat af priktest kan en blodprøve afklarer eventuel allergi.



Hvis du har særlig spørgsmål om hudpriktest er i altid velkomne til at kontakte klinikken på

Tlf: 66 13 32 11 mellem 9,00-12,00



Doctor Marla.dk
Børn & unge klinik

MARLA CHELLAKOOTY
Børnelæge, Ph.d

🏠 Skt. Anne Plads 2-4, 5 sal
5000 Odense C

☎ 66133211

📠 66133202

✉ info@doctormarla.dk

🌐 www.doctormarla.dk